

Le campagnol amphibie

Le campagnol amphibie est un rongeur semi-aquatique associé aux berges végétalisées des eaux douces. Il utilise la végétation riveraine pour s'alimenter et se protéger, ce qui lie sa présence à l'état des marges.

Un rongeur des berges végétalisées

Le campagnol amphibie est un rongeur des berges à végétation dense. Il utilise les fossés, les mares et les cours d'eau lents, où il consomme surtout des végétaux. Sa taille et son mode de vie ne doivent pas conduire à le confondre automatiquement avec un jeune ragondin.

Identifier sans confondre les mammifères nageurs

Les petits cheminements dans les herbes et certains restes d'alimentation peuvent aider les spécialistes à repérer sa présence. Des berges complètement mises à nu lui offrent moins de couvert. L'identification doit rester prudente : une brève silhouette dans l'eau ne permet pas toujours de distinguer les différents mammifères semi-aquatiques.

Le couvert de berge fournit plusieurs fonctions

Une végétation riveraine continue offre une ressource alimentaire mais réduit aussi l'exposition lors des déplacements. Son entretien peut modifier simultanément ces fonctions : une coupe uniforme retire nourriture et dissimulation au même moment. La qualité ne dépend donc pas seulement du linéaire conservé. La structure, les interruptions et les périodes d'intervention influencent l'utilisation possible de la berge, à relier également au régime de l'eau et aux refuges disponibles.

Deux notions à connaître

Végétation riveraine - Ensemble des plantes situées sur les marges d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau et influencées par cette proximité.

Linéaire d'habitat - Longueur d'un élément écologique allongé, comme une haie ou une berge, à compléter par sa structure, sa qualité et ses connexions.

Rédaction FRT Guide, avec assistance IA. Les exemples expliquent des mécanismes ; ils ne constituent pas des observations réalisées sur un site précis.

Observer et mettre en pratique

Le campagnol amphibie

Le repère essentiel

L'identification prudente protège la qualité de la donnée. Une berge fonctionnelle se comprend comme une bande végétalisée vivante, au contact de l'eau.

Ma démarche en trois étapes

1. Notez la taille relative de l'animal et la forme du museau.
2. Photographiez les herbes coupées sans ouvrir une galerie.
3. Laissez une bande de végétation continue au bord de l'eau.

Un exemple concret

Une bordure de fossé couverte de plantes offre nourriture et couvert. Après une coupe très rase, les mêmes berges deviennent plus exposées, même si l'eau reste présente. Pour ce rongeur, l'état de la végétation riveraine explique donc une partie de la qualité de l'habitat et des possibilités de circulation.

La confusion à éviter

Tout petit mammifère nageant n'est pas un jeune ragondin. Taille apparente, distance et partie immergée rendent les comparaisons difficiles. Les indices d'alimentation et de passage peuvent compléter l'observation lorsqu'ils sont interprétés par des personnes compétentes.

Vérifier ma compréhension

Quel habitat lui est particulièrement favorable ?

- A. Une rive intégralement bétonnée et sans couvert.
- B. Une berge avec une végétation herbacée dense.
- C. Une pente rocheuse éloignée de tout point d'eau.

Correction : B. Le couvert végétal lui apporte nourriture et protection au bord de l'eau.

Mon observation : lieu, date, indices et limites

.....

.....

.....

Sources et version en ligne

Parc naturel régional du Marais poitevin - Le campagnol amphibie

<https://guide.rando-map.fr/mediatheque/public/faune-sauvage/article-le-campagnol-amphibie>